

Incidencia de absceso de pared en pacientes postcesárea. Hospital Central “Dr. Plácido Daniel Rodríguez Rivero”. San Felipe, estado Yaracuy.

Vizcaya Rivas, Leyda
Yamilet¹;
Mendoza, María²;
Herrera, Adrián²;
Navarro, Mariela²;
Rivero, Mary²;
Peña, Jennifer²

¹Ambulatorio Urbano “Dr. Miguel Franco”;
²Hospital Central “Dr. Plácido Daniel Rodríguez Rivero”; Venezuela

El absceso de pared es una de las complicaciones postoperatorias de las cesáreas. Se realizó un estudio descriptivo transversal, se revisaron retrospectivamente 16 historias clínicas ingresadas con diagnóstico de puerperio quirúrgico complicado con absceso de pared, en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Central “Dr. Plácido Daniel Rodríguez Rivero”, durante el periodo de Enero a Marzo el año 2002; se recogieron los datos en un tabulador, se calcularon frecuencias absolutas y relativas, posteriormente presentadas en cuadros y graficas, con el objetivo de determinar la incidencia del absceso de pared. De 430 pacientes estudiadas se evidencio que 16 se complicaron con absceso de pared. El grupo etario dominante con 88,88% corresponde a los 16-25 años. El diagnostico se realizó en un 68,75% de los casos entre los 5 a 10 días de puerperio, en un 100% el motivo de consulta fue aumento de volumen, dolor y cambios de coloración en el área de la herida operatoria. Un 100% recibió tratamiento antibiótico con metronidazol, cefacidal y gentamicina. Con evolución satisfactoria en un 100%. Se encontró anemia asociada al diagnostico en un 77,77% de los casos. En conclusión el absceso de pared es una complicación presente en el 3,75% de las pacientes postcesárea de nuestra institución, presente con mayor frecuencia en el grupo erario de 16 a 25 años, en el puerperio de 5 a 10 días y con anemia como patología asociada.