

Asociación Virus Papiloma Humano–cáncer de cuello uterino en mujeres con edad = 35 años. Hospital Universitario “Dr. Luis Razetti”. Barcelona. Estado Anzoátegui. Venezuela. Enero 2000–Diciembre 2003

Sánchez, Rosmary¹;
Romero, Alexis¹;
Salazar, Jisbelys¹;
Marín, Claudia¹

¹Hospital Universitario
“Dr. Luis Razetti”;
Venezuela

INTRODUCCIÓN: El cáncer de cuello uterino representa un problema de salud pública, que afecta mayormente a mujeres en edad productiva y reproductiva. Actualmente considerado una Infección de transmisión sexual, debido a su etiología; El principal agresor es el Virus del Papiloma Humano, responsable del 97,7% de los casos a nivel mundial. Existen más de 70 cepas y cada una se asocia a un riesgo específico de transformación hacia lesiones intraepiteliales, escamosas de alto grado y a cáncer invasivo, siendo más frecuente en mujeres menores de 35 años. Las cepas más agresivas son las 16, 18, 45, 56. **METODOLOGÍA:** Fue un estudio retrospectivo con una población de 792 pacientes con diagnóstico de cáncer de cuello uterino, los criterios de inclusión fueron que tuvieran edades = a 35 años, antecedentes de infección por Virus de Papiloma Humano y diagnóstico de cáncer de cuello uterino. Se recolectó la información a través de las historias médicas. Para el análisis de los datos se utilizaron medidas de tendencia central y porcentajes. **RESULTADOS:** Las pacientes más afectadas fueron aquellas con edades entre 26 y 32 años (86,4%), con mayor incidencia en el año 2003, (29,12%) y la mayor frecuencia de antecedentes de infección por virus de papiloma humano fue en aquellas con edades entre 12 y 17 años (65,05%) **CONCLUSIÓN:** La infección por Virus del Papiloma Humano afecta a las mujeres en edades tempranas de la vida (menores de 18 años), siendo un factor de riesgo elevado para el desarrollo de Cáncer de cuello uterino.