

Tendencia de la tuberculosis en una zona pobre en Lima, Perú: del 2000 al 2004.

Vargas Pacherez,
Daniel¹;
Bernabe, Antonio¹

¹Perú

OBJETIVOS: Evaluar y analizar la evolución de la tuberculosis desde el año 2000 al 2004 en una zona urbano marginal de Lima. **MATERIALES Y METODOS:** Este es un estudio observacional longitudinal retrospectivo, realizado en Pampas de San Juan (Lima) desde Enero del 2000 hasta Diciembre del 2004. Los datos mostrados se obtuvieron del Libro de Sintomáticos Respiratorios y del Libro de Evolución y Seguimiento de Casos de Tuberculosis del Programa Nacional de Control para Tuberculosis. **RESULTADOS:** Durante el periodo de estudio se diagnosticaron 694 casos de tuberculosis, de los cuales 528 casos eran nuevos (76.1%) y 84 casos (12.1%) fueron por recaídas y abandonos recuperados. La forma pulmonar fue la más diagnosticada con 530 casos, teniendo el 82.1% baciloscopia positiva. La incidencia ha disminuido desde 208.96 en el 2000, hasta 174.07 por 100 000 habitantes en el 2003, aumentando a 187.05 en el 2004. La condición de egreso hasta fines del 2003 fue de 427 curados (87.5%), 27 abandonos (5.5%), 13 fracasos (2.7%) y 21 fallecidos durante el tratamiento (4.3%). **CONCLUSIONES:** Este estudio demuestra la caída sostenida de los casos reportados de tuberculosis en una zona de extrema pobreza de Lima. Se deben aprovechar los escasos recursos al máximo para controlar la tuberculosis con los nuevos problemas que acarrea, como la asociación con la infección por VIH, las formas multirresistentes y la mayor diseminación por el hacinamiento secundario a la pobreza existente en el lugar.