

## Conducta sexual de riesgo para contagio de Virus De Inmunodeficiencia Humana y otras infecciones de transmisión sexual en los adolescentes

Vizcaya Rivas, Leyda  
Yamilet<sup>1</sup>; Navarro,  
Mariela<sup>1</sup>; Herrera, Adrián<sup>1</sup>;  
Peña, Jennifer<sup>1</sup>; Rivero,  
Mary<sup>1</sup>; Pinto, Andreina<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ambulatorio Urbano "Dr.  
Miguel Franco",  
Venezuela

La adolescencia es una etapa de crecimiento y cambios importantes desde el punto de vista físico, cognoscitivo y psicosocial. El adolescente de riesgo es aquel que padece problemas en alguna de estas áreas, siendo las de mayor índice de morbilidad y mortalidad la salud reproductiva, adicción a drogas y muertes violentas. En el presente estudio de tipo descriptivo transversal, se incluye 117 adolescentes a quienes se les aplicó una encuesta para determinar su conducta sexual. 47% de los adolescentes eran el sexo masculino y 53% del sexo femenino. El 88,88% eran solteros. La mayoría (56,41%) inició su actividad sexual entre los 15 y 19 años de edad. El 46,15% ha mantenido relaciones sexuales con 2 o más parejas sexuales a la vez. El 62,39% con una frecuencia de varias veces por semana. El 72,64 % no usa preservativo o solo pocas veces. El 70,08 no usa algún método anticonceptivo. Las relaciones sexuales se consideran con riesgo de contagiarse con infecciones de transmisión sexual en el 44,44 %. Se concluye que la mayoría de los adolescentes mantienen conductas sexuales de riesgo. Se ameritan estudios de mayor profundidad para determinar el nivel de conocimiento de los peligros potenciales relacionados a este comportamiento y diseñar campañas educativas para la prevención de tales enfermedades.