

Epidemiología de la bartonelosis aguda en niños.

Maguiña, Ciro³; Breña
Chávez, Judith Patricia¹;
Pozo, Wilfredo²;
Hernández, Herminio⁴
¹Universidad Peruana
Cayetano Heredia.

²Departamento de
Medicina e Infectología
del Instituto Especializado
de Salud del Niño;

³Departamento de
Enfermedades
Trasmisibles y
Dermatológicas del
Hospital Nacional
Cayetano Heredia;

⁴Departamento de
Pediatria del Hospital
Nacional Cayetano
Heredia, Perú

INTRODUCCIÓN. El grupo más afectado por Bartonellosis son los niños. Han aparecido nuevas zonas endémicas en selva alta de Perú. **OBJETIVOS:** Determinar la edad, sexo, lugar de contacto y procedencia, estación y año en el cuál se adquirió la Bartonellosis aguda. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Se revisaron las historias de 32 niños, internados en el Hospital Nacional Cayetano Heredia y en el Instituto Especializado de Salud del Niño desde 1993 a 2003. **RESULTADOS:** La edad promedio fue 9.8 años, 47% entre los 5 y 15 años; fueron varones 23 (72%); el lugar de contacto en 19 casos (59%) fue en Ancash, 5 (16%) en Lima, 4 (13%) en Cajamarca y el resto en Cuzco, Huanuco, Junín y La Libertad. Se reportaron casos procedentes de zonas de selva alta, como San Ignacio (Cajamarca), Quillabamba (Cuzco) y Chanchamayo (Junín). Fueron nativos de zonas endémicas 23 (72%). La estación del año más frecuente fue el verano, los años de mayor incidencia fueron 1998 y 1999 acumulando en total 16 casos. **CONCLUSIONES:** El grupo etéreo más afectado fue el escolar, a predominio de los varones, si bien la mayoría procedía de áreas endémicas establecidas, algunos acudieron de zonas de selva alta. La mayoría fueron nativos. La estación más frecuente fue el verano por corresponder a los meses de lluvia y el 50% de casos se presentaron durante el brote en Ancash en 1998-99.