

Incidencia de dengue en el municipio autónomo Sifontes y su comportamiento clínico epidemiológico, por medio de casos confirmados serológicamente en el hospital tipo I “Dr. José Gregorio Hernández” de Tumeremo, estado Bolívar. Enero – noviembre del 2004.

García Catoni, Ana
Ysabel¹; Núñez
Fernández, Patricia
Ysabella²; Betí, Isabel³;
Bastidas, Walfang³;
Rosal, Nathalie³

¹Hospital Uyapar, Puerto
Ordaz; ²Hospital Rural
Tipo I, Tumeremo;
³Hospital Rural Tipo I Dr.
José Gregorio Fernández,
Tumeremo; Venezuela.

OBJETIVO GENERAL: Estimar la incidencia de dengue en el municipio Sifontes y evaluar su comportamiento clínico epidemiológico por medio de casos confirmados serológicamente en el Hospital Tipo I “Dr. José Gregorio Hernández” de Tumeremo, Estado Bolívar entre los meses Enero – Diciembre del 2004. **OBJETIVOS ESPECÍFICOS:** a. Identificar la distribución por grupo etario y sexo de fiebre dengue b. Definir los signos y síntomas más frecuentes en pacientes con dengue de acuerdo a su forma clínica, al sexo y edad. c. Determinar en pacientes con serología positiva para dengue el porcentaje de hospitalización. d. Establecer la mayor prevalencia por parroquias de ésta entidad en el municipio Sifontes. e. Señalar las medidas de prevención y control sobre el vector del dengue. f. Analizar si existe sub-registro (sea por falta de sospecha diagnóstica, ausencia de pesquisa y seguimiento de los casos, el déficit en el llenado de la ficha epidemiológica y la historia clínica del paciente). **MARCO METODOLÓGICO:** Se realizó un estudio descriptivo, observacional, y de tipo transversal; el universo estuvo conformado por 6.100 pacientes que acudieron con síndrome febril. La muestra, a su vez estuvo constituida por 152 pacientes con Serología positiva para dengue. **Criterios de Inclusión:** Todo paciente con serología positiva para el virus del Dengue del Municipio Sifontes y ausencia de criterios de exclusión (pacientes provenientes de otros municipios). **Procedimiento de recolección de datos:** Se procedió a la revisión de registros de morbilidad de los pacientes que asistieron a la consulta Emergencia del Hospital entre los meses de Enero – Noviembre del 2004, para seleccionar la muestra de estudio, se aplicaron una de las fichas según si en paciente iba a ser tratado de manera ambulatoria o si se procedía a su hospitalización. **Análisis Estadístico:** Se realizó un análisis descriptivo para la muestra con medidas de posición central intervalo: promedio y frecuencias relativas. **RESULTADOS Y CONCLUSIONES:** El sexo predominante en el presente trabajo fue el sexo masculino con un 57,24% con un pequeño margen de diferencia del sexo femenino 42,78%. En cuanto al grupo etario en el sexo masculino fue de 0 – 11 años y en el femenino de 11 – 20 años. No existe marcada diferencia entre los pacientes hospitalizados y no hospitalizados con diagnóstico de fiebre dengue. La fiebre seguida de la cefalea fueron los síntomas más frecuentes como motivo de consulta indiferentemente del grupo etario y el sexo. Los meses con más casos de dengue son los meses de Mayo y Julio. El sector con mayor número de casos de dengue es Sifontes seguido del Zabaleta y la Manga. No se tiene seguimiento de los pacientes con diagnóstico de fiebre dengue ya que al recuperarse no acuden más a la emergencia del hospital, además de no llenarse las fichas epidemiológicas de forma oportuna.