



## Medidas aislamiento

### AISLAMIENTO PRECOZ

Habitación de aislamiento con cuna + si es posible y en previsión de la realización del parto cuna térmica, monitorización fetal, oxigenoterapia, carro medicación

## Pruebas diagnosticas

- **RX tórax:** si necesidad, no se demorará por el embarazo
- **Eco fetal:** según semanas embarazo, gravedad cuadro clínico materno y bienestar fetal
- **RCTG:** para control bienestar fetal en función semana de embarazo

## Tratamiento

- Lopinavir/ritonavir o Remdesivir (\*)
- Control infección
- Oxigenoterapia si requiere
- Evitar sobrecarga fluidos
- Tto antibiótico empírico si sospecha de coinfección
- Monitorización dinámica uterina y bienestar fetal
- Ventilación mecánica precoz si deterioro función respiratoria

## Finalización del embarazo

### Evaluar vía

vaginal o cesárea (1ºcriterio obstétrico + 2ºprotección personal asistente que deberá llevar EPI correspondiente)

### Evitar traslado paritorio

+ Personal que atiende parto con EPI (gorro, gafas, batas impermeables, guantes, mascarilla FFP2)

### Casos graves

se valorar finalización en función estado clínico madre semanas embarazo

- Evaluación de forma individual a cada embarazada por un equipo multidisciplinar

## Maduración pulmonar

### USO CORTICOIDES:

Valoración por equipo. Puede usarse para maduración pulmonar fetal

(\*) CONSULTAR Documento de manejo clínico de pacientes COVID-19